

0歳のうちに接種しておきましょう

集団生活が始まるまでに早めに接種することをお勧めします。

|                             | ワクチン名                     | チェック欄 |                   | 備考                          |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
|                             |                           | 1回    | 2回                |                             |
| 定期接種                        | ヒブ                        | 1回    |                   | 接種開始の月齢によって接種回数が異なります       |
|                             |                           | 2回    |                   |                             |
|                             |                           | 3回    |                   |                             |
|                             | 小児用肺炎球菌                   | 1回    |                   | 接種開始の月齢によって接種回数が異なります       |
|                             |                           | 2回    |                   |                             |
|                             |                           | 3回    |                   |                             |
|                             | 四種混合<br>(三種混合＋<br>不活化ポリオ) | 1回    |                   | 三種混合と不活化ポリオを別々で接種している人は不要です |
|                             |                           | 2回    |                   |                             |
|                             |                           | 3回    |                   |                             |
| 三種混合<br>(ジフテリア、<br>百日咳、破傷風) | 1回                        |       | 四種混合を接種している人は不要です |                             |
|                             | 2回                        |       |                   |                             |
|                             | 3回                        |       |                   |                             |
| 不活化ポリオ                      | 1回                        |       | 四種混合を接種している人は不要です |                             |
|                             | 2回                        |       |                   |                             |
|                             | 3回                        |       |                   |                             |
| BCG(結核)                     | 1回                        |       | 5か月から集団接種         |                             |

## 任意接種（有料）

- ・ B型肝炎

インフルエンザや接種スケジュール等については、かかりつけの医療機関で相談してください。